

表. わが国で承認されているマラリア治療薬

	投与方法*	備考
キニーネ塩酸塩	成人には1回 500 mg を1日3回、7日間経口投与 ドキシサイクリン1回 100 mg を1日2回、またはクリン ダマイシン1回 600 mg を1日3回 7日間併用する（保 険適応外）	
メフロキン	成人には初回 750 mg 塩基（3錠）、6-24時間後に 500 mg 塩基（2錠）を経口投与	幼児、小児に対する安全性は確立していない。 空腹時を避けて服用させる
アトバコン・ プログアニル合剤	成人には1日1回4錠を3日間経口投与	食後に服用させる 重度の腎障害がある患者への投与は禁忌 下痢、嘔吐がある場合は代替薬を検討
小児用アトバコン・ プログアニル合剤	体重に応じて、以下の投与量を1日1回・3日間経口投与 5-8kg : 125 mg/50 mg (2錠) 9-10kg : 187.5 mg/75 mg (3錠) 11-20kg : 250 mg/100 mg (4錠) 21-30kg : 500 mg/200 mg (8錠) 31-40kg : 750 mg/300 mg (12錠) ≥40kg : 1000 mg/400 mg (16錠)	
プリマキン	成人には 30 mg 塩基を1日1回・14日間経口投与する 小児には 0.5 mg/kg(最大 30 mg)を1日1回・14日間投与	食後に服用させる
アルテメテル・ ルメファントリン合剤	成人には1回4錠を1日2回、3日間経口投与 小児には体重に応じて、以下の投与量を1日2回・計6 回経口投与 5-15kg : 20 mg/120 mg (1錠) 15-25kg : 40 mg/240 mg (2錠) 25-35kg : 60 mg/360 mg (3錠) ≥35kg : 80 mg/480 mg (4錠)	食後に服用させる

*文献 1)より。詳細は添付文書を参照のこと