

図. 2017(平成29)年1月~2018(平成30)年3月までに環境水サーベイランスによって検出されたエンテロウイルス

調査地点 (n=検体数、調査期間)		2017年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2018年1月	2月	3月		
北海道・東北・新潟	A (n=42、1月、8月から1月)	E6	斜線					E3 E6 E7			E3 E7	E3 E7	CB4 E7	CB2 CB4 E7	CB4	CB4	斜線	
	B (n=90、1月から3月)	CB5																
	C (n=120、1月から3月)	E6	斜線					E7	E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6 E7	斜線			E3
	D (n=150、1月から3月)	E3 E6	E3	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E6	E6	E6	E6	E6	E6	E6	E6	E7	CB1 E25	CB1	CB1
関東・甲信・静	E (n=7、1月から12月)	E6	E6	E6	E6	斜線					E7	E7	E7	E7	E30	斜線		
	F (n=150、1月から3月)	E6	E6	斜線					E7	E6	E6	E6	E7	E7	E7	E7	E7	CB4
	G(2か所) (n=300、1月から3月)	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E6 E7
	H (n=90、1月から3月)	E6	斜線					E6	E6	E6	E6	E6	E6	E6	E6	E6	E6	E6
東海・北陸	I (n=120、1月から3月)	E6 E18	E3	E6	E6	斜線					E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3	
	J (n=90、1月から3月)	E6	E6	E6	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3	
	K (n=90、1月から3月)	E6	E6	E6	E3	E3	E6	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3	E3	
近畿	L(3か所) (n=540、1月から3月)	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3	
	M(3か所) (n=270、1月から3月)	E6	斜線					E6	E6	E6	E6	E6	E6	E6	E6	E6	E6	
	N (n=180、1月から3月)	E3	斜線					E6	E7	E6	E6	E6	E6	E6	E6	E6	E6	
	O (n=90、1月から3月)	E3 E18	E3 E18	E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	E3 E6	
中国・四国	P (n=90、1月から3月)	E6	斜線					E3	E6	E6	E6	E3	E3	E6	E6	E6		
九州	Q(2か所) (n=72、7月から12月)	斜線					NPEV					斜線						
	R (n=36、6月から11月)	斜線					CB2					斜線						

2か月以上検出されたエンテロウイルスは灰色で示した。斜線部は調査を実施していない月を示す。
 CA: Cocksackievirus, group A E: Echovirus CB: Cocksackievirus, group B NPEV: non-polio/enterovirus

