


※接種期間は添付文書の内容を参考に作成しました（一部改変）

# 日本の定期／任意予防接種スケジュール（0～20歳）

2025年1月16日現在



平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれて20歳未満の者 \*15

A類定期接種対象期間
接種可能期間

A類定期接種 (標準的な接種期間 (ロタウイルスワクチンについては、初回接種の推奨期間))

接種量・接種回数等が変わる年齢  
↓ 接種の例

肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者 \*3 (皮下又は筋肉内接種)

肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者 \*3

第2期

第1期

第2期

第1期

第2期

※接種期間は添付文書の内容を参考に作成しました（一部改変）

# 日本の定期／任意予防接種スケジュール（20歳以上）

ワクチン名		20歳	30歳	40歳	50歳	60歳	65歳	70歳	75歳	80歳	85歳	90歳	95歳	100歳～	
B型肝炎 <sup>*1</sup>		[接種可能期間]													
肺炎球菌	15価結合型	肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者 <sup>*3</sup> （筋肉内接種）													
	20価結合型	肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者 <sup>*3</sup>													
Hib（インフルエンザ菌b型） <sup>*7</sup>		[接種可能期間]													
DPT（3種混合） <sup>*9</sup>		[接種可能期間]													
IPV（不活化ポリオ） <sup>*10</sup>		[接種可能期間]													
DT（2種混合）		[接種可能期間]													
BCG		[接種可能期間]													
麻疹・風疹混合（MR）		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>第5期</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           1962年4月2日～1979年4月1生まれ（2024年4月1日現在、45～62歳）の男性でHI抗体価が8以下相当<sup>*13</sup>の者。原則、MRワクチンを使用する。クーポン券使用時はMRワクチンのみ。         </div> </div>													
麻疹（はしか）		[接種可能期間]													
風疹		[接種可能期間]													
水痘		[接種可能期間]													
おたふくかぜ（流行性耳下腺炎）		[接種可能期間]													
日本脳炎		[接種可能期間]													
HPV <sup>*16</sup> （ヒトパピローマウイルス）	2価	[接種可能期間]													
	4価	[接種可能期間]													
	9価 <sup>*17</sup>	[接種可能期間]													
インフルエンザ		1回接種量0.5mL、1回又は2回接種（原則、1回接種）													
肺炎球菌（23価多糖体ポリサッカライド） <sup>*18</sup>		[接種可能期間]													
RSウイルス	GSK社製 <sup>*19</sup>	* 50歳～59歳はRSウイルスによる感染症が重症化するリスクが高いと考えられる者 <sup>*</sup>													
	ファイザー社製 <sup>*20</sup>	妊娠24～36週の妊婦に1回0.5mL接種													
A型肝炎		[接種可能期間]													
破傷風トキソイド		[接種可能期間]													
髄膜炎菌（4価結合体） <sup>*21</sup>		[接種可能期間]													
黄熱 <sup>*22</sup>		[接種可能期間]													
狂犬病 <sup>*23</sup>	皮下接種 （09M）（イオロジクス社製）	曝露前免疫 曝露後免疫													
	筋肉内接種 （オニファック）（パンフアック社製）	曝露前免疫 曝露後免疫													
带状疱疹	生（水痘ワクチン）	50歳以上1回皮下接種													
	不活化 <sup>*24</sup>	带状疱疹に罹患するリスクが高いと考えられる者													
新型コロナウイルス <sup>*25</sup>		ワクチンにより接種量が異なる													
ダニ媒介脳炎 <sup>*26</sup>		1回接種量0.5mL													

■ 接種量・接種回数等が変わる年齢  
    接種可能期間  
    A類定期接種対象期間  
    B類定期接種対象期間（一部の基礎疾患を有する者）  
    A類定期接種（標準的な接種期間）  
    B類定期接種対象期間

- \*1 2016年10月1日から定期接種導入。HBグロブリンと併用して定期接種ではなく健康保険で受ける。
- \*2 「出生〇週後」は、生まれた日を0日として計算する。初回接種は出生14週6日後までに行う。1価で2回接種、5価で3回接種のいずれかを選択。2020年10月1日から、2020年8月1日以降に生まれた児を対象に定期接種導入。
- \*3 2024年4月1日より15価結合型が、2024年10月1日より20価結合型が定期接種に導入。皮下又は筋肉内接種。生後2か月以上7か月未満で開始し、27日以上の間隔で3回接種。追加免疫は通常、生後12～15か月に1回接種の合計4回接種。接種もれ者には、次のようなスケジュールで接種。接種開始が生後7か月以上12か月未満の場合：27日以上の間隔で2回接種したのち、60日間以上あけてかつ1歳以降に1回追加接種。1歳：60日間以上の間隔で2回接種。2歳以上5歳未満：1回接種。
- \*4 D：ジフテリア、P：百日咳、T：破傷風、IPV：不活化ポリオ、Hib：インフルエンザ菌b型を表す。IPVは2012年9月1日から、DPT-IPVは2012年11月1日から、Hibは2013年4月1日から、DPT-IPV-Hibは2024年4月1日から定期接種に導入。DPT-IPV-HibおよびDPT-IPVは、生ポリオワクチン株であるセービン株を不活化したIPVを混合したDPT-siPV-HibワクチンとDPT-siPVワクチン。第1期の接種においてはDPT-IPV-Hib、DPT-IPVとHib（DPTとIPVとHib）等使用するワクチンを選択可能な場合であっても、原則として、同一種類のワクチンを必要回数接種する。
- \*5 初回接種については標準として生後2か月以上7か月未満で接種を開始し、20日以上（標準的には20～56日まで）の間隔をおいて3回、皮下または筋肉内接種する。初回接種から6か月以上（標準的には6～18か月）の間隔をおいて1回皮下または筋肉内接種する。なお、Hib感染症の定期接種としてDPT-IPV-Hibを使用する場合は初回接種の開始時の月齢に関わらず接種回数を減じる取り扱いは不要。
- \*6 2008年12月19日から国内での接種開始。生後2か月以上5歳未満の間にある者に行うが、標準として生後2か月以上7か月未満で接種を開始すること。接種方法は、通常、生後12か月に至るまでの間に27日以上の間隔で3回皮下接種（医師が必要と認めた場合には20日間隔で接種可能）。接種開始が生後7か月以上12か月未満の場合は、通常、生後12か月に至るまでの間に27日以上の間隔で2回皮下接種（医師が必要と認めた場合には20日間隔で接種可能）。初回接種から7か月以上あけて、1回皮下接種（追加）。接種開始が1歳以上5歳未満の場合、通常、1回皮下接種。
- \*7 初回接種については標準として生後2か月以上12か月に至るまでの間に20日以上（標準的には20～56日まで）の間隔をおいて3回皮下接種。初回接種から6か月以上（標準的には12～18か月）の間隔をおいて1回皮下接種する。
- \*8 2018年1月29日から再び使用可能となった。
- \*9 原則としてMRワクチンを接種。なお、同じ期内で麻疹ワクチン又は風疹ワクチンのいずれか一方を受けた者、あるいは特に単抗原ワクチンの接種を希望する者は単抗原ワクチンの選択可能。
- \*10 詳細は[https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/rubella/Rubella-Hltiter8\\_Ver4.pdf](https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/rubella/Rubella-Hltiter8_Ver4.pdf)を参照。
- \*11 2014年10月1日から定期接種導入。3か月以上（標準的には6～12か月）の間隔をあけて2回接種。
- \*12 基本的に同一のワクチンを規定の回数、筋肉内に接種。接種間隔・回数はワクチンによって異なる。なお、2020年12月から4価ワクチンの対象に9歳以上の男性が加わったが、定期接種の対象は小学校6年生～高校1年生相当年齢の女性のみ。平成9年度生まれ～平成19年度生まれの女性で、過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない者は、令和4年4月～令和7年3月の間、改めての接種機会あり。
- \*13 9歳以上の女性に、1回0.5mLを合計3回、筋肉内注射。2回目は初回接種の2か月後、3回目は6か月後に接種。初回接種の2か月後及び6か月後に接種できない場合、2回目接種は初回接種から少なくとも1か月以上、3回目接種は2回目接種から少なくとも3か月以上の間隔をおいて接種する。9歳以上15歳未満の女性は、初回接種から6～12か月の間隔を置いた合計2回の接種とすることができる。
- \*14 定期接種は毎年1回。
- \*15 2014年10月1日から定期接種導入。2024年度から65歳の者が接種対象。
- \*16 ワクチンにより接種量、対象年齢が異なるため、詳細は添付文書を参照。

予防接種法に基づく定期の予防接種は、本図に示したように、政令で接種対象年齢が定められています。この年齢以外で接種する場合は、任意接種として受けることになります。ただしワクチン毎に定められた接種年齢がありますのでご注意ください。  
なお、↓ は一例を示したものです。接種スケジュールの立て方については被接種者の体調・生活環境、基礎疾患の有無等を考慮して、かかりつけ医あるいは自治体の担当者とはよく御相談下さい。