



\*1 2008年12月19日から国内での接種開始。生後2か月以上5歳未満の間にある者に行うが、標準として生後2か月以上7か月未満で接種を開始すること。接種方法は、通常、生後12か月に至るまでの間に27日以上の間隔で3回皮下接種(医師が必要と認めた場合には20日間隔で接種可能)。初回接種が7か月以上あけて1回皮下接種(追加)。接種開始が1歳以上5歳未満の場合、通常、1回皮下接種

\*2 2013年11月21日から7価結合型に替わって定期接種に導入。生後2か月以上7か月未満で開始し、27日以上の間隔で2回接種したのち、60日間以上あけてかつ1歳以降に1回追加接種。1歳:60日間以上の間隔で2回接種。2歳以上5歳未満:1回接種。

\*3 2016年10月1日から定期接種導入。母子感染予防はHBs抗原と併用して定期接種ではなく健康保険で受ける。

\*4 「出生〇週後」は、生まれた日を〇日として計算する。初回接種は出生14週6日頃までに、1回で2回接種、5回で3回接種のいずれかを選択。2020年10月1日から、2020年8月1日以降に生まれた児を対象に定期接種導入。

\*5 D: 日本脳炎、P: 百日咳、T: 破傷風、IPV: 不活化ポリオを表す。IPVは2012年9月1日から、DPT-IPV混合ワクチンは2012年11月1日から定期接種に導入。回数は4回接種だが、OPV(生ポリオワクチン)を1回接種している場合は、IPVをあと3回接種、OPVは2012年9月1日以降定期接種としては使用できなくなった。DPT-IPVワクチンは、生ポリオワクチン株であるサービン株を不活化したIPVを混合したDPT-sIPVワクチン。

\*6 2018年1月29日から再び使用可能となった。

\*7 原則としてMRワクチンを接種。なお、同じ期内で麻疹ワクチンまたは風疹ワクチンのいずれか一方を受けた者、あるいは特に単抗原ワクチンの接種を希望する者は単抗原ワクチンの選択可能。

\*8 詳細は [https://www.niid.go.jp/niid/images/jdsc/disease/rubella/Rubella-HItiter8\\_Ver4.pdf](https://www.niid.go.jp/niid/images/jdsc/disease/rubella/Rubella-HItiter8_Ver4.pdf) を参照。

\*9 2014年10月1日から定期接種導入。3か月以上(標準的には6~12か月)の間隔をあけて2回接種。

\*10 互換性に関するデータがないため、同一のワクチンを3回続けて筋肉内に接種。接種間隔はワクチンによって異なる。平成9年度生まれ~平成17年度生まれの女性で、過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない者は、令和4年4月~令和7年3月の間、改めての接種機会あり。

\*11 定期接種は毎年1回

\*12 2014年10月1日から定期接種導入。2019年度は、年度内に65・70・75・80・85・90・95・100歳以上になる者、2020年4月1日からは、年度内に65・70・75・80・85・90・95・100歳になる者であって、まだ未接種の者は定期接種として1回接種可能。

\*13 2021年2月14日に製造販売承認(コナチン筋注:ファイザー社)。2月17日から接種開始。日局生食塩水1.8mLにて希釈し、1回0.3mLを合計2回、通常、3週間の間隔で筋肉内に接種する。2021年6月1日から接種年齢が「16歳以上」から「12歳以上」に変更。2回目から5か月以上空いていれば3回目、3回目から5か月以上空いていれば4回目接種可能。

\*14 2022年1月21日に特別承認され、2022年1月26日の予防接種・ワクチン分科会で承認。3週間以上の間隔をあけて2回接種。生食塩水1.3mLで希釈して1回0.2mL接種。

\*15 2021年5月21日に製造販売承認(スバイクバックス筋注:モデルナ社)。5月22日から接種開始。希釈せず、1回0.5mLを合計2回、通常、4週間の間隔を置いて、筋肉内に接種する。2021年8月3日から接種年齢が「18歳以上」から「12歳以上」に変更。18歳以上は2回目から5か月以上空いていれば3回目、3回目から5か月以上空いていれば4回目接種可能。3、4回目接種は1回0.25mLを筋肉内に接種する。

\*16 2021年5月21日に製造販売承認(キクスセリア筋注:アストラゼネカ社)。8月3日から接種開始。希釈せず、1回0.5mLを合計2回、通常、4~12週間の間隔(8週間以上の間隔を希望する)を置いて、筋肉内に接種する。2021年8月3日の適用開始時点における接種対象者は以下のとおり。18歳未満の者への接種には使用しないこと。また、必要がある場合を除き、18歳以上40歳未満の者への接種には使用しないこと。必要がある場合は、以下に該当する場合であること。: 対象者が他の新型コロナウイルスワクチンではなく特にアストラゼネカ社のコロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン(遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター)の接種を希望する場合(他の新型コロナウイルス含有成分へのアレルギーがある場合等)、他の新型コロナウイルスの流通停止等、緊急の必要がある場合

\*17 武田/ノババックス社: 2022年4月19日製造販売承認(スバイクバックス筋注:武田/ノババックス社)。2022年5月25日から接種開始。12歳以上に対し、希釈せず、1回0.5mLを合計2回、通常、3週間の間隔を置いて、筋肉内に接種する。18歳以上は2回目から6か月以上空いていれば3回目接種可能。

予防接種法に基づき定期の予防接種は、本図に示したように、改めて接種対象年齢が定められています。この年齢以外で接種する場合は、任意接種として受けることとなります。ただしワクチン毎に定められた接種年齢がありますのでご注意ください。なお、↓は一例を示したものです。接種スケジュールの立て方については被接種者の年齢・生活環境、基礎疾患の有無等を考慮して、かかりつけ医あるいは自治体の担当者として御相談下さい。 © Copyright 2022 CSIER All Rights Reserved. 無断転載を禁じます。