

ワクチン名	出生2週後	3ヶ月	6ヶ月	9ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳
Hib (インフルエンザ菌b型) *1																								
肺炎球菌 13価結合型 *2																								
肺炎球菌 15価結合型 *3																								
B型肝炎 *4																								
ロタウイルス *5	1価 5価																							
DPT-IPV (4種混合) *6																								
DPT(3種混合) *7																								
IPV(不活化ポリオ) *8																								
DT(2種混合)																								
BCG																								
麻疹・風疹混合(MR) *10																								
麻疹(はしか)																								
風疹																								
水痘 *12																								
おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)																								
日本脳炎																								
HPV *15 (ヒトピローマウイルス)	2価 4価 9価 *16																							
インフルエンザ *17																								
肺炎球菌 (23価莢膜 ポリサッカライド) *18																								
A型肝炎																								
破傷風トキソイド																								
髄膜炎菌 (4価結合体) *19																								
黄熱 *20																								
狂犬病 *21	皮下接種 KM/イオジックス社製 曝露前免疫 曝露後免疫																							
	筋肉内接種 (GSK社製) 曝露前免疫 曝露後免疫																							
成人用ジフテリアトキソイド																								
帯状疱疹 不活化 *22																								
新型コロナ	ファイザー社 5~11歳用 ファイザー社 6ヶ月~4歳用 ファイザー社 モデルナ社 武田ノバルベックス社																							

予防接種法に基づく定期の予防接種は、本図に示したように、政令で接種対象年齢が定められています。この年齢以外で接種する場合は、任意接種として受けることになります。ただしワクチン毎に定められた接種年齢がありますのでご注意下さい。  
なお、↓は一例を示したもので、接種スケジュールの立て方については被接種者の体調・生活環境、基礎疾患の有無等を考慮して、かかりつけ医あるいは自治体の担当者とよく御相談下さい。

## 日本の定期／臨時／任意予防接種スケジュール（20歳以上）

ワクチン名	20歳	30歳	40歳	50歳	60歳	65歳	70歳	75歳	80歳	85歳	90歳	95歳	100歳
Hib (インフルエンザ菌b型) *1													
肺炎球菌 13価結合型	肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者 *2												
肺炎球菌 15価結合型	肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者*2(筋肉内接種)												
B型肝炎 *4													
DPT (3種混合) *7													
IPV (不活化ポリオ) *8													
DT (2種混合)													
BCG													
麻疹・風疹混合(MR)													
麻疹(はしか)													
風疹													
水痘													
おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)													
日本脳炎													
HPV *15 (ヒトパピローマウイルス)	2価												
	4価												
	9価*16												
インフルエンザ *17	1回接種量0.5mL、1回または2回接種(原則、1回接種)												
肺炎球菌 (23価荚膜ポリサッカライド)*18													
A型肝炎													
破傷風トキソイド													
髄膜炎菌 (4価結合体)*19													
黄熱 *20													
狂犬病 *21	皮下接種 IHM/イオロックス社製	曝露前免疫											
	筋肉内接種 (GSK社製)	曝露後免疫											
成人用ジフテリアトキソイド													
帯状疱疹	生(水痘ワクチン)									50歳以上1回皮下接種			
	不活化 *22	帯状疱疹に罹患するリスクが高いと考えられる者								0.5mLを2か月間隔で2回、筋肉内に接種する。			
新型コロナ	ファイザー社	*23											
	モデルナ社	*26											
	武田/ノバルティクス社	*27											

予防接種法に基づく定期の予防接種は、本図に示したように、政令で接種対象年齢が定められています。この年齢以外で接種する場合は、任意接種として受けれることになります。ただしワクチン毎に定められた接種年齢がありますのでご注意下さい。

なお、↓は一例を示したもので、接種スケジュールの立て方については被接種者の体調・生活環境、基礎疾患の有無等を考慮して、かかりつけ医あるいは自治体の担当者とよく御相談下さい。

\*1 2008年12月19日から国内での接種開始。通常、本剤の接種は生後2か月以上5歳未満の間にある者に行うが、標準として生後2か月以上7か月未満で接種を開始すること。接種方法は、通常、生後12か月に至るまでの間に27日以上の間隔で3回皮下接種(医師が必要と認めた場合には20日間隔で接種可能)。接種開始が生後7か月以上12か月未満の場合は、通常、生後12か月に至るまでの間に27日以上の間隔で2回皮下接種(医師が必要と認めた場合には20日間隔で接種可能)。初回接種から7か月以上あけて、1回皮下接種(追加)。接種開始が1歳以上5歳未満の場合、通常、1回皮下接種。発作性夜間ヘモグロビン尿症でペグセタコプラン(製品名:エムバベリ皮下注<sup>®</sup>)を投与する場合は健康保険適用あり。

\*2 2013年11月1日から7価結合型に替わって定期接種に導入。生後2か月以上7か月未満で開始し、27日以上の間隔で3回接種。追加免疫は通常、生後12~15か月に1回接種の合計4回接種。接種もれには、次のようなスケジュールで接種。

接種開始が生後7か月以上12か月未満の場合：27日以上の間隔で2回接種したのち、60日間以上あけてかつ1歳以降に1回追加接種。

接種開始が1歳：60日間以上の間隔で2回接種。

接種開始が2歳以上5歳未満：1回接種。

2014年6月から65歳以上の高齢者への接種が可能となる。

2020年5月29日から、6歳以上65歳未満への接種が可能となる。対象は、「肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者」。

なお、「肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者」とは、以下のような状態の者を指す。

- ・慢性的な心疾患、肺疾患、肝疾患又は腎疾患
- ・糖尿病
- ・基礎疾患若しくは治療により免疫不全状態である又はその状態が疑われる者
- ・先天的又は後天的無脾症（無脾症候群、脾臓摘出術を受けた者等）
- ・鎌状赤血球症又はその他の異常ヘモグロビン症
- ・人工内耳の装用、慢性髄液漏等の解剖学的原因により生体防御機能が低下した者
- ・上記以外で医師が本剤の接種を必要と認めた者

注：接種方法が年齢により異なる。2か月齢以上6歳未満は皮下接種、6歳以上は筋肉内接種。

\*3 2023年4月10日から国内での接種開始。高齢者又は肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる18歳以上の者に、1回0.5mL筋肉内接種。肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる2か月以上18歳未満の者に、1回0.5mLを皮下又は筋肉内接種。肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高い者については、\*2参照。

\*4 2016年10月1日から定期接種導入。2016年4月1日以降に生まれた者が対象。母子感染予防はHBグロブリンと併用して定期接種ではなく健康保険で受ける。

健康保険適用：

①B型肝炎ウイルス母子感染の予防(抗HBs人免疫グロブリンとの併用)【HBワクチン】通常、0.25mLを1回、生後12時間以内を目安に皮下接種（被接種者の状況に応じて生後12時間以降とするとも可能。その場合であっても生後できるだけ早期に行う）。更に0.25mLずつを初回接種の1か月後及び6か月後の2回、皮下接種。ただし、能動的HBs抗体が獲得されていない場合には追加接種。【HBIG（原則としてHBワクチンとの併用）】初回注射は0.5~1.0mLを筋肉内注射。時期は生後5日以内（なお、生後12時間以内が望ましい）。また、追加注射には0.16~0.24mL/kgを投与。2013年10月18日から接種月齢変更。

②血友病患者に「B型肝炎の予防」の目的で使用した場合

③業務外で「HBs抗原陽性かつHBe抗原陽性の血液による汚染事故後のB型肝炎発症予防(抗HBs人免疫グロブリンとの併用)」

労災保険適用：

①業務上、HBs抗原陽性かつHBe抗原陽性血液による汚染を受けた場合(抗HBs人免疫グロブリンとの併用)

②業務上、既存の負傷にHBs抗原陽性かつHBe抗原陽性血液が付着し汚染を受けた場合(抗HBs人免疫グロブリンとの併用)

\*5 「出生○週後」は、生まれた日を0日として計算する。初回接種は出生14週6日後までに行う。1価で2回接種、5価で3回接種のいずれかを選択。2020年10月1日から、2020年8月1日以降に生まれた児を対象に定期接種導入。

\*6 D：ジフテリア、P：百日咳、T：破傷風、IPV：不活化ポリオを表す。IPVは2012年9月1日から、DPT-IPV混合ワクチンは2012年11月1日から定期接種に導入。回数は4回接種だが、OPV(生ポリオワクチン)を1回接種している場合は、IPVをあと3回接種。OPVは2012年9月1日以降定期接種としては使用できなくなった。DPT-IPVワクチンは、生ポリオワクチン株であるセービン株を不活化したIPVを混合したDPT-sIPVワクチン。

\*7 2018年1月29日から再び使用可能となつた。

\*8 なお、生ポリオワクチン(OPV)2回接種者は、ポリオ流行国渡航前を除き、IPVの接種は不要。OPV1回接種者はIPV3回接種。OPV未接種者はIPV4回接種。

\*9 緊急避難的に接種する場合がある。

\*10 原則としてMRワクチンを接種。なお、同じ期内で麻疹ワクチンまたは風疹ワクチンのいずれか一方を受けた者、あるいは特に単抗原ワクチンの接種を希望する者は単抗原ワクチンの選択可能。

\*11 詳細は[https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/rubella/Rubella-H1titer8\\_Ver4.pdf](https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/rubella/Rubella-H1titer8_Ver4.pdf)を参照。

\*12 2014年10月1日から定期接種導入。3か月以上（標準的には6~12か月）の間隔をあけて2回接種。

\*13 平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれの者は生後6か月から90か月未満と9歳から13歳未満の期間内であれば定期接種として第1期の接種可能。

\*14 平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの者で4回の接種が終わっていない者。ただし20歳未満の者に限る。

\*15 基本的に同一のワクチンを規定の回数、筋肉内に接種。接種間隔・回数はワクチンによって異なる。なお、2020年12月から4価ワクチンの対象に9歳以上の男性が加わったが、定期接種の対象は小学校6年生~高校1年生相当年齢の女性のみ。平成9年度生まれ~平成18年度生まれの女性で、過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない者は、令和4年4月~令和7年3月の間、改めての接種機会あり。

\*16 9歳以上の女性に、1回0.5mLを合計3回、筋肉内注射。2回目は初回接種の2か月後、3回目は6か月後に接種。初回接種の2か月後及び6か月後に接種できない場合、2回目接種は初回接種から少なくとも1か月以上、3回目接種は2回目接種から少なくとも3か月以上の間隔をおいて接種する。9歳以上15歳未満の女性は、初回接種から6~12か月の間隔を置いた合計2回の接種とすることができます。

\*17 定期接種は毎年1回。KMバイオロジクス（株）、（一財）阪大微生物病研究会、テンカ（株）のインフルエンザワクチンは生後6か月以上、第一三共（株）のインフルエンザワクチンは1歳以上が接種対象者。

\*18 2014年10月1日から定期接種導入。2019年度は、年度内に65・70・75・80・85・90・95・100歳以上になる者。2020年4月1日からは、年度内に65・70・75・80・85・90・95・100歳になる者であつて、まだ未接種の者は定期接種として1回接種可能。なお、「2歳以上の脾摘患者における肺炎球菌による感染症の発生予防」の目的で使用した場合にのみ健康保険適用あり。

\*19 2023年10月1日現在、ジフテリアトキソイド結合ワクチン(製品名:メナクトラ<sup>®</sup>筋注)と、破傷風トキソイド結合ワクチン(製品名:メンケアップド<sup>®</sup>筋注)がある。血清群A,C,Y,Wによる侵襲性髄膜炎菌感染症を予防する。発作性夜間ヘモグロビン尿症における溶血抑制、非典型溶血性尿毒症症候群における血栓性微小血管障害の抑制、全身型重症筋無力症、あるいは視神経脊髄炎スペクトルム障害(視神経脊髄炎を含む)の再発予防でエクリズマブ(製品名:シリリス<sup>®</sup>点滴静注)を投与する場合、及び発作性夜間ヘモグロビン尿症、非典型溶血性尿毒症症候群、あるいは全身型重症筋無力症でラブリズマブ(製品名:ユルトミリス<sup>®</sup>点滴静注)を投与する場合、及び寒冷凝集素症でスチムリマブ(製品名:エジャイモ<sup>®</sup>点滴静注)、及び発作性夜間ヘモグロビン尿症でペグセタコプラン(製品名:エムバベリ皮下注<sup>®</sup>)を投与する場合は健康保険適用あり。補体阻害薬の適正使用上、2歳未満でも髄膜炎菌ワクチンの接種が必要な症例あり。

\*20 一般医療機関での接種は行われておらず、検疫所での接種。

\*21 2つの製剤があるが、KMバイオロジクス（株）製は皮下接種、GSK（株）製は筋肉内接種で行う。接種間隔、接種回数はそれぞれのワクチンの添付文書を参照のこと。なお、2022年10月現在、KMバイオロジクス（株）製は出荷停止されており、供給再開時期は未定である。

\*22 50歳以上の者には、0.5mLを2回、通常、2か月の間隔をおいて、筋肉内に接種する。帯状疱疹に罹患するリスクが高いと考えられる18歳以上の者には、0.5mLを2回、通常、1~2か月の間隔をおいて、筋肉内に接種する。帯状疱疹に罹患するリスクが高いと考えられる者とは、以下のようない状態の者を指す。

・疾病又は治療により免疫不全である者、免疫機能が低下した者又は免疫機能が低下する可能性がある者

・上記以外で、医師が本剤の接種を必要と認めた者

\*23 2023年9月1日に製造販売承認（コニタティRTU筋注(1価:XBB.1.5):ファイザー社）。9月20日から接種開始。12歳以上の者に初回免疫として、1回0.3mLを合計2回、通常、3週間の間隔で、追加免疫として、1回0.3mLを筋肉内に接種する。前回のSARS-CoV-2ワクチンの接種から少なくとも3か月経過した後に接種可能。

\*24 2023年9月1日に製造販売承認（コニタティ筋注5~11歳用(1価:XBB.1.5):ファイザー社）。9月20日から接種開始。日局生理食塩液1.3mLに溶解して用いる。初回免疫として、1回0.2mLを合計2回、通常、3週間の間隔で筋肉内に接種する。追加免疫として前回のSARS-CoV-2ワクチンの接種から少なくとも3か月経過した後に接種可能。

- \*25 2023年9月1日に製造販売承認(コミナティ筋注 6カ月～4歳用(1価:XBB.1.5) : ファイザー社)。9月20日より接種開始。日局生理食塩液2.2mLに溶解して用いる。初回免疫として、1回0.2mLを合計3回、筋肉内に接種する。2回目は通常3週間の間隔で、3回目は2回目の接種から少なくとも8週間経過した後に接種する。追加免疫として前回のSARS-CoV-2ワクチンの接種から少なくとも3か月経過した後に接種可能。
- \*26 2023年9月12日に製造販売承認(スパイクバックス筋注(1価:オミクロン株XBB.1.5) : モデルナ社)。9月25日より接種開始。12歳以上の者は初回免疫として1回1mL、追加免疫として1回0.5mL。6歳以上12歳未満の者は初回免疫として1回0.5mL、追加免疫として1回0.25mL。生後6ヶ月以上6歳未満の者は初回免疫として1回0.25mLを筋肉内に接種する。初回免疫として通常4週間の間隔をおいて2回接種する。追加免疫として前回のSARS-CoV-2ワクチンの接種から少なくとも3か月経過した後に接種可能。
- \*27 2022年4月19日製造販売承認(ヌバキソビット筋注:武田/ノバルバックス社)。5月25日から接種開始。12歳以上に対し、希釈せず、1回0.5mLを合計2回、通常、3週間の間隔をおいて、筋肉内に接種する。追加免疫として、12歳以上は前回のSARS-CoV-2ワクチンの接種から少なくとも6か月経過した後に接種可能。