


年齢群別のインフルエンザ抗体保有状況, 2023/24シーズン前^{※1}

～ 2023年度感染症流行予測調査より ～

※1 主に2023年7～9月に採取された血清の測定結果：2024年5月現在暫定値


A(H1N1)pdm09亜型

[抗体価測定：赤血球凝集抑制法 / n = 3,958]



A(H3N2)亜型

[抗体価測定：赤血球凝集抑制法 / n = 3,958]



抗体価 ■ ≥1:40 ▲ ≥1:80 ○ ≥1:160 * ≥1:320 — ≥1:640 + ≥1:1280

流行予測2023


年齢群別のインフルエンザ抗体保有状況, 2023/24シーズン前^{※1}

～ 2023年度感染症流行予測調査より ～

※1 主に2023年7～9月に採取された血清の測定結果：2024年5月現在暫定値


B型(山形系統)

[抗体価測定：赤血球凝集抑制法 / n = 3,958]



B型(ビクトリア系統)

[抗体価測定：赤血球凝集抑制法 / n = 3,958]



抗体価 ■ ≥1:40 ▲ ≥1:80 ○ ≥1:160 * ≥1:320 — ≥1:640 - - ≥1:1280

流行予測2023

【 2023年度インフルエンザ感受性調査実施都道府県 】

北海道, 茨城県, 栃木県, 群馬県, 東京都, 神奈川県, 新潟県, 福井県, 山梨県, 長野県, 静岡県, 愛知県, 三重県, 愛媛県, 高知県, 沖縄県