



◎ 8月7日より	福岡	太宰府 9月4日	10	90% (9/10頭)	44% (4/9頭)	8月7日	タ(10頭/10頭)がHI抗体陽性。2-ME感受性抗体は保持していなかった。
◎ 8月21日より	高知	中村 9月11日	10	70% (7/10頭)	0% (0/7頭)	8月21日	9月4日は40%のブタ(4頭/10頭)がHI抗体陽性。そのうち100%(2頭/2頭)が2-ME感受性抗体を保持していた。
◎ 9月4日より	愛媛	大洲 9月17日	20	25% (5/20頭)	0% (0/5頭)	9月4日	9月4日は75%のブタ(15頭/20頭)がHI抗体陽性。36%(5/14頭)が2-ME感受性抗体を保持していた。
	香川	坂出 9月10日	20	15% (3/20頭)		8月20日	9月3日は陰性(0頭/20頭)。
◎ 8月20日より	広島	三次 9月26日	10	100% (10/10頭)	100% (9/9頭)	8月20日	9月17日は10%のブタ(1頭/10頭)がHI抗体陽性。100%(1/1頭)が2-ME感受性抗体を保持していた。
	島根	島根 9月17日	20	5% (1/20頭)	100% (1/1頭)	9月4日	9月4日は20%のブタ(4頭/20頭)がHI抗体陽性。そのうち100%(4頭/4頭)が2-ME感受性抗体を保持していた。
◎ 9月4日より	和歌山	9月4日 ～6日	15	53% (8/15頭)	29% (2/7頭)	9月4日	8月28日は陰性(0頭/19頭)。
	奈良	奈良 9月11日	23	0%			9月4日も陰性(0頭/19頭)。
	兵庫	西播磨 10月15日	15	0%		10月1日	10月1日は20%のブタ(3頭/15頭)がHI抗体陽性。100%(3頭/3頭)が2-ME感受性抗体を保持していた。
	滋賀	滋賀 9月20日	10	10% (1/10頭)			9月14日は陰性(0頭/10頭)。
	三重	松阪 9月11日	10	10% (1/10頭)			8月28日は10%のブタ(1頭/10頭)がHI抗体陽性。2-ME感受性抗体は保持していなかった。
◎ 8月13日より	静岡	小笠 9月26日	20	95% (19/20頭)	41% (7/17頭)	7月23日	9月3日は90%のブタ(9頭/10頭)がHI抗体陽性。そのうち44%(4/9頭)が2-ME感受性抗体を保持していた。
◎ 9月14日より	山梨	山梨 9月21日	10	60% (6/10頭)	20% (1/5頭)	9月14日	9月14日は80%のブタ(8頭/10頭)がHI抗体陽性。そのうち13%(1頭/8頭)が2-ME感受性抗体を保持していた。
◎ 9月5日より	石川	金沢 9月26日	10	100% (10/10頭)	20% (2/10頭)	9月5日	9月18日は100%のブタ(10頭/10頭)がHI抗体陽性。80%(8頭/10頭)が2-ME感受性抗体を保持していた。
◎ 9月18日より	富山	新湊 10月2日	20	60% (12/20頭)	50% (6/12頭)	9月11日	9月25日は20%のブタ(4頭/20頭)がHI抗体陽性。そのうち75%(3頭/4頭)が2-ME感受性抗体を保持していた。
	新潟	新潟 9月25日	10	10% (1/10頭)		9月17日	9月17日は10%のブタ(1頭/10頭)がHI抗体陽性。100%(1頭/1頭)が2-ME感受性抗体を保持していた。
	神奈川	平塚 9月25日	20	10% (2/20頭)	100% (2/2頭)	9月4日	9月18日は陰性(0頭/20頭)。

	東京	八王子 10月15日 ～18日	50	10% (5/50頭)	50% (2/4頭)	10月1日 ～4日	10月1日～4日は4%のブタ(2頭/50頭)がHI抗体陽性。100%(2頭/2頭)が2-ME感受性抗体を保持していた。
◎ 9月3日より	千葉	旭 10月15日	20	95% (19/20頭)	0% (0/17頭)	9月3日	10月1日は95%のブタ(19頭/20頭)がHI抗体陽性。79%(15頭/19頭)が2-ME感受性抗体を保持していた。
	群馬	玉村 9月18日	16	6% (1/16頭)			8月21日は陰性(0頭/16頭)。
	栃木	宇都宮 10月15日	20	5% (1/20頭)		9月17日	10月1日は5%のブタ(1頭/20頭)がHI抗体陽性。
	茨城	水戸 9月26日	13	15% (2/13頭)	0% (0/1頭)	9月19日	9月19日は8%のブタ(1頭/12頭)がHI抗体陽性。100%(1頭/1頭)が2-ME感受性抗体を保持していた。
	秋田	秋田 9月27日	12	0%			9月13日も陰性(0頭/12頭)。
	宮城	仙南 10月17日	27	0%			10月1日は陰性(0頭/26頭)。
	青森	十和田 9月下旬	10	0%			9月中旬も陰性(0頭/10頭)。
	青森	津軽 9月下旬	10	0%			9月中旬は10%のブタ(1頭/10頭)がHI抗体陽性。
	北海道	道南 8月16日	10	0%			8月2日も陰性(0頭/10頭)。
	北海道	道央 8月27日	10	0%			8月20日も陰性(0頭/10頭)。
	北海道	北見 9月11日	10	0%			8月30日も陰性(0頭/10頭)。
	北海道	空知 9月27日	10	0%			9月10日も陰性(0頭/10頭)。
◎	日本脳炎ウイルス汚染が推定された地域 (今シーズンの調査で、調査ブタにおいて、1：10以上のHI抗体保有率が50%を越え、かつ2-ME感受性抗体が検出された地域)						
☆	日本脳炎HI抗体及び2-ME感受性抗体の保有率以外の情報より日本脳炎ウイルス汚染が推定された地域						
*	2-ME感受性抗体の検査は、1：40以上のHI抗体価を示した血清について調査した。						
		今シーズンの調査で、ブタのHI抗体保有率が80%を越えた地域					
		今シーズンの調査で、ブタのHI抗体保有率が50%を越え、かつ2-ME感受性抗体が検出された地域					
		今シーズンの調査で、ブタの新鮮感染(2-ME感受性抗体)が検出された地域					